

Bijlage 1 bij de Regeling Medische zorg Asielzoekers Fysiotherapie/Oefentherapie (versie vanaf 01-03-2024)

Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die plegen te bieden ter behandeling van de in Bijlage 1 Besluit zorgverzekering aangegeven aandoeningen, voor zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden.

Aandoeningen	Behandelduur
Aandoening van het zenuwstelsel	
Cerebrovasculair accident	
Ruggenmergaandoening	
Multipele sclerose	
Perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval	
Extrapiramidale aandoening	
Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar	
Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel	
Cerebellaire aandoening	
Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel	
Radiculair syndroom met motorische uitval	Maximaal 3 maanden
Spierziekte	
Myasthenia gravis	
Aandoening van het bewegingsapparaat	
Aangeboren afwijking	
Progressieve scoliose	
Juvenile osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar	
Reflexdystrofie	
Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget	
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	Maximaal 12 maanden
Hyperostotische spondylose (morbus Forestier)	
Collageenziekten	
Status na amputatie	
Whiplash	Maximaal 3 maanden, indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal 6 maanden.
Postpartum bekkeninstabiliteit	Maximaal 3 maanden
Fracturen indien deze conservatief worden behandeld	Maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling
Overige aandoeningen	
Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius	
Lymfoedeem	
Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma	

Overige aandoeningen (vervolg)	
Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling	Maximaal 12 maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling
Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine	Maximaal 12 maanden
Weke delen tumoren	Maximaal 2 jaren na bestraling
Diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis	

Onder de aanspraak valt ook:

- Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 9 behandelingen.
- Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen). Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
- Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
- Gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD), indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden indien er sprake is van een klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Indien sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg ten hoogste 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 3 behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren. Indien sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg 70 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 52 behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren.
- Valpreventieve beweeginterventie voor verzekerden met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Uit de valrisicotest moet gebleken zijn dat er sprake is van een hoog valrisico. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden.